

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3094. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.05.01. Лечебное дело

1. Варианта, имеющая наибольшую частоту в вариационном ряду, называется

- медианой
 - **модой**
 - средним квадратическим отклонением
 - интервалом
-

2. Варианта, делящая вариационный ряд пополам по числу наблюдений, называется

- интервалом
 - средним квадратическим отклонением
 - **медианой**
 - модой
-

3. Степень варьирования вариационного ряда определяется с помощью

- медианы (Me)
 - моды (Mo)
 - **среднего квадратического отклонения**
 - средней ошибки средней арифметической
-

4. Пробу манту с 2 те считают положительной при минимальном размере папулы (в мм)

- 4
 - 6
 - **5**
 - 7
-

5. Пробу манту с 2 те у детей и подростков считают гиперергической при минимальном размере папулы (мм)

- 15
 - **17**
 - 21
 - 12
-

6. Более чувствительным методом выявления возбудителя туберкулёза является

- **культуральный**
- иммунологический
- прямая бактериоскопия
- люминесцентная микроскопия

7. К методам верификации туберкулёза относят

- **бактериологический и цито-гистологический**
 - биохимический и иммунологический
 - рентгенологический и радиоизотопный
 - пробное лечение и динамическое наблюдение
-

8. В лаважной жидкости, полученной от больного туберкулёзом органов дыхания, преобладают

- **лимфоциты**
 - альвеолоциты
 - эозинофилы
 - нейтрофилы
-

9. После постановки внутрикожной пробы с препаратом аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (диаскинтест) результат оценивают через (в часах)

- 6
 - **72**
 - 24
 - 12
-

10. Клинически малосимптомно, без изменений, выявляемых с помощью инструментальных методов обследования, протекает _____ туберкулёз лёгких

- фиброзно-кавернозный
 - инфильтративный
 - цирротический
 - **очаговый**
-