

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3040. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.05.03. Стоматология

1. При системной гипоплазии эмали поражаются

- временные и постоянные резцы
 - зубы одного периода формирования
 - зубы-антагонисты
 - только первые моляры
-

2. Уменьшение клинической высоты коронки зуба характерно для

- вколоченного вывиха
 - вывиха зуба без смещения
 - ушиба зуба
 - полного вывиха
-

3. Вторичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите является

- пятно
 - пузырёк
 - папула
 - эрозия
-

4. Начальный кариес (стадия мелового пятна) временных зубов характеризуется

- нарушением формирования эмали
 - подповерхностной деминерализацией
 - некрозом эмали
 - поверхностной деминерализацией
-

5. Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с

- репаративной гранулёмой
 - одонтомой
 - радикулярной кистой
 - цементомой
-

6. Отвёрткообразная или бочкообразная форма коронки и полулунная выемка на режущем крае центральных резцов характерны для зубов

- Фурнье
- Тернера
- Пфлюгера
- Гетчинсона

7. Возбудителем герпангины является

- вирус простого герпеса
 - вирус гриппа
 - **вирус Коксаки**
 - цитомегаловирус
-

8. При хронических формах пульпита обнаруживается микрофлора

- **смешанная**
 - грибковая
 - стафилококковая
 - стрептококковая
-

9. Идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта является синдромом

- Аспергера
 - Стентона – Капдепона
 - **Папийона – Лефевра**
 - Блоха – Сульцбергера
-

10. Закладка зубной пластинки происходит в период внутриутробного развития плода на неделе

- **6-7**
 - 8-9
 - 10-16
 - 21-30
-