

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3701. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.18. Неонатология

1. В этиотропной терапии врождённой герпетической инфекции препаратом выбора является

- ацикловир
 - видарабин
 - азитромицин
 - ампициллин
-

2. После введения новорождённому ребёнку вакцины бцж в месте инъекции папула может появиться через (в месяцах)

- 2-2,5
 - 1-1,5
 - 2-3
 - 3-4
-

3. Искусственный сурфактант недоношенным детям вводится

- внутримышечно
 - энтерально
 - эндотрахеально
 - внутривенно
-

4. Гипербилирубинемия с повышением уровня непрямого билирубина отмечается при

- геморрагической болезни новорождённого
 - дефиците альфа-1-антитрипсина
 - врождённой краснухе
 - гемолитической болезни новорождённого
-

5. Установочной (начальной) величиной пикового давления при начале ивл у доношенного новорожденного следует считать (в см вод. ст.)

- 30-40
 - 40-50
 - 20-25
 - 25-35
-

6. Понятие «перинатальная смертность» включает в себя показатели

- неонатальной и постнеонатальной смертности
 - ранней и поздней неонатальной смертности
 - **ранней неонатальной смертности и мертворождаемости**
 - младенческой смертности и мертворождаемости
-

7. Для диагностики синдрома заглоченной крови у новорожденного используют

- исследование общего анализа периферической крови
 - бактериологическое исследование промывных вод желудка
 - исследование коагулограммы
 - **тест Апта**
-

8. Развитие болезни гиалиновых мембран у новорожденного обусловлено

- аспирацией
 - инфекцией
 - асфиксией
 - **недостаточным синтезом сурфактанта**
-

9. Степень тяжести синдрома дыхательных расстройств у недоношенных оценивается по шкале

- Дементьевой
 - Апгар
 - **Сильвермана**
 - Дубовица
-

10. В основе гемолитической болезни новорожденного лежит

- **изоиммунная гемолитическая анемия**
 - внутриутробная инфекция
 - гемоглобинопатия
 - незрелость глюкуронил трансферазы печени
-