

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 4266. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **31.08.19. Педиатрия (ординатура, ПП)**

### **1. Методом определения кислотности желудочного секрета является**

- **pH-метрия**
  - уреазный тест
  - фракционный метод
  - дыхательный тест
- 

### **2. В диагностике целиакии решающим в обследовании является**

- **эзофагогастродуоденоскопия с биопсией тонкой кишки**
  - копрологическое исследование
  - определение антител к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови
  - УЗИ брюшной полости
- 

### **3. Синдром Жильбера характеризуется**

- повышением уровня трансаминаз
  - прямой гипербилирубинемией
  - **непрямой гипербилирубинемией**
  - ретикулоцитозом
- 

### **4. Методом диагностики обострения хронического панкреатита является**

- эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта
  - определение уровня трансглутаминазы в сыворотке крови
  - **определение уровня ферментов поджелудочной железы в крови**
  - обзорная рентгенография брюшной полости
- 

### **5. Гиперлипидемия характерна для**

- нефритического синдрома
  - тубулоинтерстициального нефрита
  - **нефротического синдрома**
  - хронического пиелонефрита
- 

### **6. Наиболее частым возбудителем при развитии острого первичного пиелонефрита является**

- клебсиелла
  - синегнойная палочка
  - протей
  - **кишечная палочка**
-

### 7. Показанием к проведению микционной цистографии является

- нарушение функционального состояния почек
  - подозрение на наличие аномалий развития почек
  - учащенное болезненное мочеиспускание
  - подозрение на наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса
- 

### 8. Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о

- аномалии развития органов мочевой системы
  - остром гломерулонефрите
  - остром пиелонефрите
  - гемолитико-уремическом синдроме
- 

### 9. Противопоказанием для проведения экскреторной урографии является

- непереносимость белков коровьего молока
  - хроническая болезнь почек 1 стадии
  - непереносимость йода
  - пищевая аллергия в анамнезе
- 

### 10. При транспортировке больного с переломом позвоночника оптимальным положением является

- на боку на носилках
  - на щите, на животе
  - на щите, на спине с соблюдением «оси безопасности»
  - на носилках в положении «лягушки»
-