

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2766. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.48. Скорая медицинская помощь

1. Основной функциональной единицей станции скорой медицинской помощи является

- **выездная бригада**
 - врачебная бригада
 - отделение скорой медицинской помощи
 - фельдшерская бригада
-

2. При инфаркте миокарда передней локализации изменения на экг регистрируются в отведениях

- I, aVL, V1-V6
 - I, aVL, V5-V6
 - **V1-V4**
 - II, III, aVF
-

3. Самым частым осложнением острого инфаркта миокарда является

- эмболия мозга
 - синдром Дресслера
 - **нарушение ритма**
 - кардиогенный шок
-

4. Причиной внезапной коронарной смерти чаще всего является

- АВ-блокада II степени
 - **фибрилляция желудочков**
 - полная АВ-блокада
 - асистолия желудочков
-

5. Непрямой массаж сердца у взрослых проводится в ритме (в надавливаниях в минуту)

- **100-120**
 - 30-50
 - свыше 120
 - 10-20
-

6. Поводом для прекращения сердечно-лёгочной реанимации служит отсутствие признаков восстановления кровообращения и дыхания при использовании всех доступных методов в течение (в минутах)

- 10
 - 30
 - 20
 - 45
-

7. При проведении закрытого массажа сердца пациент должен находиться на поверхности

- твёрдой пружинящей
 - мягкой пружинящей
 - мягкой
 - твёрдой
-

8. При артериальном кровотечении кровоостанавливающий жгут накладывается

- на 15-20 см ниже раны
 - на обработанную рану
 - ниже раны на 30 см
 - выше раны на 10-15 см
-

9. При венозном кровотечении из конечности кровоостанавливающий жгут накладывается

- выше раны на 10-15 см
 - на обработанную рану
 - выше раны на 30 см
 - ниже раны, расстояние - в зависимости от места кровотечения
-

10. Кровоостанавливающий жгут летом накладывается не более, чем на (в часах)

- 2
 - 3
 - 2,5
 - 1,5
-