

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2742. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **31.08.51. Фтизиатрия**

### **1. К методам верификации туберкулёза относят**

- рентгенологический и радиоизотопный
  - **бактериологический и цито-гистологический**
  - биохимический и иммунологический
  - пробное лечение и динамическое наблюдение
- 

### **2. Вакцина бцж содержит**

- убитые микобактерии бычьего вида
  - **живые ослабленные микобактерии бычьего вида**
  - убитые микобактерии бычьего и человеческого видов
  - живые ослабленные микобактерии человеческого вида
- 

### **3. К группе населения с более высокой заболеваемостью туберкулёзом относятся**

- женщины
  - подростки
  - дети
  - **мужчины**
- 

### **4. Слой населения с более высокой заболеваемостью туберкулёзом составляют**

- городские жители
  - военнослужащие
  - жители сельской местности
  - **мигранты**
- 

### **5. Развитие вторичной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза более вероятно при**

- **лечении одним препаратом**
  - наличии сопутствующих заболеваний
  - отсутствии патогенетической терапии
  - вторичном иммунодефиците
-

**6. Микобактериоз лёгких, вызванный заражением атипичным штаммом микобактерии, удается достоверно отличить от туберкулёза по**

- клиническому течению заболевания
  - рентгенологическим проявлениям заболевания
  - **характеру обнаруженного возбудителя**
  - макроскопической оценке операционного материала
- 

**7. Заболевание туберкулёзом в настоящее время чаще выявляется у**

- лиц среднего возраста (40-59 лет)
  - пожилых людей (60 лет и старше)
  - **лиц молодого возраста (до 40 лет)**
  - детей и подростков (до 18 лет)
- 

**8. Самым опасным в эпидемиологическом плане источником туберкулёзной инфекции являются больные**

- туберкулёзом внутригрудных лимфатических узлов
  - туберкулёзным спондилитом
  - **фиброзно-кавернозным туберкулезом лёгких**
  - цирротическим туберкулёзом легких
- 

**9. Минимальный размер папулы, при котором пробу манту с 2 те у детей и подростков считают гиперергической, составляет (мм)**

- **17**
  - 12
  - 7
  - 15
- 

**10. Первичное туберкулезное инфицирование выявляется с помощью**

- магниторезонансной томографии органов грудной клетки
  - компьютерной томографии органов грудной клетки
  - **туберкулинодиагностики**
  - сцинтиграфии лёгких
-