

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2604. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.54. Общая врачебная практика (семейная медицина)

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- при окончании лечения
 - с первого дня заболевания или травмы
 - по желанию пациента
 - **в день признания его временно нетрудоспособным**
-

2. При поражении задних рогов спинного мозга возникает

- расстройство болевой чувствительности по проводниковому типу
 - расстройство глубокой чувствительности по проводниковому типу
 - периферический парез
 - **сегментарно-диссоциированный тип расстройства чувствительности**
-

3. Арефлексия детрузора мочевого пузыря возникает при поражении

- шейного отдела спинного мозга
 - **крестцового отдела спинного мозга**
 - ствола головного мозга
 - поясничного отдела спинного мозга
-

4. Псевдобульбарный синдром возникает при поражении

- добавочного нерва
 - языкоглоточного и блуждающего нервов
 - подъязычного нерва
 - **корково-ядерного пути с двух сторон**
-

5. Наиболее частой причиной кардиоэмболического инсульта у взрослых пациентов является

- тромбоз левого желудочка после трансмурального инфаркта миокарда
 - незаросшее овальное отверстие с парадоксальной эмболией
 - инфекционный эндокардит клапанов левых отделов сердца
 - **фибрилляция предсердий**
-

6. При рассеянном склерозе первично страдает

- кора головного мозга
- **белое вещество головного и спинного мозга**
- базальные ганглии
- клетки передних рогов спинного мозга

7. Основным методом диагностики полиневропатии является

- электронейромиография
 - МРТ периферических нервов
 - ультразвуковое исследование нервов
 - биохимический анализ цереброспинальной жидкости
-

8. Основной целью проведения рентгенографии позвоночника при боли в спине является

- определение локализации сдавления корешковых структур
 - выявление межпозвонковых грыж
 - определение степени остеопороза
 - определение выраженности остеохондроза позвоночника
-

9. К основному методу диагностики опухоли головного мозга относят

- электроэнцефалографию
 - магнитно-резонансную томографию
 - эхоэнцефалоскопию
 - краниографию
-

10. Признаком посткоммоционного синдрома является

- атаксия
 - астения
 - гемиплегия
 - диплопия
-