

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1963. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.70. Эндоскопия

1. Наиболее характерным осложнением дивертикула двенадцатиперстной кишки является

- перфорация
 - кровотечение
 - дивертикулит
 - язва дивертикула
-

2. Эндобронхиальные методы лечения для окончательного заживления дефекта в культе бронха будут наиболее эффективны при диаметре дефекта в бронхе не более (мм)

- 1,5-2
 - 5-7
 - 2,5-4
 - 8-10
-

3. Риск аденокарциномы пищевода увеличивается при размере сегмента пищевода барретта более (в см)

- 1,5
 - 3
 - 2
 - 1
-

4. Перед проведением колоноскопии за 2-3 дня до исследования следует отменить

- препараты железа
 - прокинетики
 - гормональные препараты
 - антибиотики
-

5. При подготовке к колоноскопии за 2-3 дня до исследования из пищевого рациона следует исключить

- кисломолочные продукты
 - мясо и птицу
 - мед
 - крупы и орехи
-

6. Наиболее характерным местом колонизации желудка helicobacter pylori инфекцией является

- тело желудка
 - антральный отдел
 - дно желудка
 - кардия
-

7. Для оценки распространения опухоли пищевода за пределы органа наиболее информативным исследованием является

- эзофагоскопия
 - рентгеноконтрастная эзофагография
 - компьютерная томография
 - обзорная рентгенография грудной клетки
-

8. Аккредитация врача-эндоскописта проводится каждые (в годах)

- 3
 - 5
 - 6
 - 4
-

9. В стенке пищевода проходят анастомозы

- портокавальные
 - паравертебральные
 - каваренальные
 - кавакавальные
-

10. Продольная складчатость слизистой оболочки желудка выражена в

- своде
 - антруме
 - теле
 - кардии
-