

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3622. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.72. Стоматология общей практики

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- **в день признания его временно нетрудоспособным**
 - с первого дня заболевания или травмы
 - по желанию пациента
 - при окончании лечения
-

2. Корень в стадии незакрытой верхушки на рентгенограмме проецируется

- короче нормальной длины, корневого канал узкий
 - **нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие широкое**
 - нормальной длины, апикальное отверстие узкое, периодонтальная щель у верхушки корня широкая
 - нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие узкое
-

3. Клинической формой гипоплазии эмали является

- «рифлёная» эмаль
 - меловидно-крапчатая
 - **бороздчатая**
 - дисплазия Капдепона
-

4. Затруднённое, учащённое дыхание с экспираторной одышкой у ребёнка характерно для

- болевого шока
 - **анафилактического шока**
 - обморока
 - сердечно-сосудистого коллапса
-

5. Наиболее характерным видом травмы временных зубов является

- перелом корня
 - **вывих зуба**
 - ушиб зуба
 - отлом коронки
-

6. Травма зачатка постоянного зуба преимущественно наблюдается при травме временного зуба в виде

- внедрённого (вколоченного) вывиха
 - перелома корня
 - ушиба зуба
 - неполного вывиха
-

7. Предрасполагающим фактором вывиха резцов верхней челюсти у детей является

- мелкое преддверие рта
 - глубокий прогнатический прикус
 - множественный кариес этих зубов и его осложнения
 - мезиальная окклюзия
-

8. Метод витальной окраски выявляет очаговую деминерализацию при

- эрозии эмали
 - белом кариозном пятне
 - кариозном пигментированном пятне
 - пятнистой форме гипоплазии
-

9. Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при

- атрофическом гингивите
 - локальном и генерализованном гингивите
 - генерализованном гингивите
 - локальном пародонтите
-

10. Формалиновая проба положительна при

- атрофическом гингивите
 - гипертрофическом гингивите
 - катаральном гингивите
 - пародонтите
-