

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2914. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.73. Стоматология терапевтическая

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- при окончании лечения
 - с первого дня заболевания или травмы
 - **в день признания его временно нетрудоспособным**
 - по желанию пациента
-

2. Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при

- **локальном пародонтите**
 - генерализованном гингивите
 - атрофическом гингивите
 - локальном и генерализованном гингивите
-

3. К факторам, способствующим развитию локального хронического гингивита, относят

- заболевания крови
 - **скученность зубов**
 - экссудативный диатез
 - заболевания желудочно-кишечного тракта
-

4. С помощью амидопириновой пробы определяют

- наличие жира
 - **остатки крови на инструментах**
 - остатки моющих средств
 - стерильность инструментов
-

5. Интенсивность кариеса зубов выражается

- суммой запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума
 - суммой кариозных и запломбированных зубов у одного индивидуума
 - отношением суммы кариозных и запломбированных зубов к возрасту пациента
 - **суммой кариозных, запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума**
-

6. Пелликула зуба образуется из

- **гликопротеидов слюны**
- энамелобластов
- муцина
- эмалевого органа

7. К местным противопоказаниям к отбеливанию зубов относят

- беременность и лактацию
- онкологические заболевания
- патологию эмали
- отягощенный аллергоанамнез

8. Целью некрэктомии при препарировании кариозной полости является

- создание контактного пункта
- финирирование полости
- восстановление формы зуба
- исключение рецидива кариеса

9. Каналонаполнитель предназначен для

- внесения пломбировочного материала в корневой канал
- определения глубины корневого канала
- распломбирования каналов
- удаления пульпы

10. Тоннельный способ препарирования кариозной полости ii класса позволяет

- сохранить жевательную поверхность
 - сохранить биологию пульпы
 - сохранить существующий естественный контактный пункт
 - формировать контактный пункт
-