

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2058. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.75. Стоматология ортопедическая

1. Показанием к изготовлению мостовидного протеза является

- пародонтит тяжёлой степени
 - концевой дефект
 - дефект естественной коронки зуба
 - **включённый дефект зубного ряда**
-

2. Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

- пластиночного протеза
 - **цельнолитой коронки**
 - бюгельного протеза
 - штампованной коронки
-

3. Задний край индивидуальной ложки верхней челюсти при полной адентии

- должен перекрывать линию «А» на 3-4 мм
 - должен заканчиваться на линии «А»
 - не должен доходить до линии «А» на 5 мм
 - **должен перекрывать линию «А» на 1-2 мм**
-

4. При изготовлении съёмного пластиночного протеза плотность фиссурно-бугоркового контакта между искусственными зубами и зубами-антагонистами проверяется на этапе

- **проверки конструкции съёмного протеза**
 - определения центрального соотношения челюстей
 - определения центральной окклюзии
 - припасовки индивидуальной ложки
-

5. Ориентиром для постановки центральных резцов на верхней челюсти служит расположение

- **срединной линии лица**
 - носогубных складок
 - крыльев носа
 - фильтрума верхней губы
-

6. При нанесении ориентиров для постановки искусственных зубов линия, опущенная от крыла носа, соответствует

- середине первого премоляра
 - медиальной поверхности клыка
 - середине клыка
 - дистальной поверхности клыка
-

7. Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к

- эстетическому дефекту в области шейки зуба
 - затруднённому положению коронки
 - ослаблению фиксации коронки
 - травме пародонта
-

8. Перед снятием двухслойного оттиска ретракция десны необходима, чтобы

- получить точный отпечаток поддесневой части зуба
 - получить точный отпечаток наддесневой части зуба
 - остановить кровотечение
 - обезболить десневой край
-

9. К неметаллическим коронкам можно отнести

- цельнолитые
 - цельнокерамические
 - металлокерамические
 - металлоакриловые
-

10. При значении индекса разрушения окклюзионной поверхности зуба по в.ю. миликевичу (иропз) = 0,7 показано лечение

- штифтовой конструкцией
 - искусственной коронкой
 - вкладкой
 - пломбой
-