

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1440. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.77. Ортодонтия

1. При открывании рта суставные головки нижней челюсти сдвигаются в сторону _____ суставного бугорка

- в нижней трети
 - у основания
 - **к вершине**
 - на середине
-

2. Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом

- реопародонтографии
 - аксиографии
 - **электромиографии**
 - артофонографии
-

3. Угол spp/mr в норме составляет (в градусах)

- **25**
 - 7
 - 32
 - 12
-

4. К моменту рождения у ребёнка наблюдается младенческая

- ретрузия
 - прогения
 - **ретрогения**
 - протрузия
-

5. Адентия зуба относится к аномалии

- размера
 - **количества**
 - структуры твёрдых тканей
 - формы
-

6. Привычка сосания большого пальца приводит к

- глубокой резцовой дизокклюзии
- протрузии нижних резцов
- мезиальной окклюзии
- **вертикальной резцовой дизокклюзии**

7. К аномалиям размеров зубов относится

- макродентия
 - макрогнатия
 - микрогнатия
 - макроглоссия
-

8. Функцию смыкания губ можно нормализовать

- удалением зубов по методу Хотца
 - пластикой уздечки нижней губы
 - пластикой уздечки верхней губы
 - нормализацией положения языка в акте глотания
-

9. Линия, соответствующая основанию верхней челюсти, обозначается

- ML
 - NL
 - FH
 - NSL
-

10. Точка a является

- наиболее глубокой точкой на переднем контуре апикального базиса нижней челюсти
 - центром турецкого седла
 - передней точкой носолобного шва
 - наиболее глубокой точкой на переднем контуре апикального базиса верхней челюсти
-