

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3094. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **91.05.01. Лечебное дело (ПП)**

**1. Варианта, имеющая наибольшую частоту в вариационном ряду, называется**

- модой
  - средним квадратическим отклонением
  - медианой
  - интервалом
- 

**2. Варианта, делящая вариационный ряд пополам по числу наблюдений, называется**

- средним квадратическим отклонением
  - модой
  - медианой
  - интервалом
- 

**3. Степень варьирования вариационного ряда определяется с помощью**

- моды ( $M_0$ )
  - медианы ( $M_e$ )
  - средней ошибки средней арифметической
  - среднего квадратического отклонения
- 

**4. Пробу манту с 2 те считают положительной при минимальном размере папулы (в мм)**

- 5
  - 4
  - 7
  - 6
- 

**5. Пробу манту с 2 те у детей и подростков считают гиперергической при минимальном размере папулы (мм)**

- 12
  - 21
  - 15
  - 17
- 

**6. Более чувствительным методом выявления возбудителя туберкулёза является**

- люминесцентная микроскопия
- иммунологический
- прямая бактериоскопия
- культуральный

---

**7. К методам верификации туберкулёза относят**

- рентгенологический и радиоизотопный
- пробное лечение и динамическое наблюдение
- биохимический и иммунологический
- **бактериологический и цито-гистологический**

---

**8. В лаважной жидкости, полученной от больного туберкулёзом органов дыхания, преобладают**

- нейтрофилы
- альвеолоциты
- эозинофилы
- **лимфоциты**

---

**9. После постановки внутрикожной пробы с препаратом диаскинтест результат оценивают через (в часах)**

- 24
- **72**
- 6
- 12

---

**10. Клинически малосимптомно, без изменений, выявляемых с помощью инструментальных методов обследования, протекает \_\_\_\_\_ туберкулёз лёгких**

- инфильтративный
  - фиброзно-кавернозный
  - **очаговый**
  - цирротический
-