

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3046. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

91.05.03. Стоматология (ПП)

1. При системной гипоплазии эмали поражаются

- зубы одного периода формирования
 - только первые моляры
 - временные и постоянные резцы
 - зубы-антагонисты
-

2. Уменьшение клинической высоты коронки зуба характерно для

- полного вывиха
 - ушиба зуба
 - вывиха зуба без смещения
 - вколоченного вывиха
-

3. Вторичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите является

- пятно
 - эрозия
 - папула
 - пузырьёк
-

4. Начальный кариес (стадия мелового пятна) временных зубов характеризуется

- нарушением формирования эмали
 - поверхностной деминерализацией
 - подповерхностной деминерализацией
 - некрозом эмали
-

5. Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с

- радикулярной кистой
 - репаративной гранулёмой
 - цементомой
 - одонтомой
-

6. Отвёрткообразная или бочкообразная форма коронки и полулунная выемка на режущем крае центральных резцов характерны для зубов

- Гетчинсона
- Пфлюгера
- Тернера
- Фурнье

7. Возбудителем герпангины является

- **вирус Коксаки**
 - вирус простого герпеса
 - вирус гриппа
 - цитомегаловирус
-

8. При хронических формах пульпита обнаруживается микрофлора

- грибковая
 - стафилококковая
 - стрептококковая
 - **смешанная**
-

9. Идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта является синдромом

- Аспергера
 - Блоха – Сульцбергера
 - Стентона – Капдепона
 - **Папийона – Лефевра**
-

10. Закладка зубной пластинки происходит в период внутриутробного развития плода на неделе

- **6-7**
 - 21-30
 - 8-9
 - 10-16
-