

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1389. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.04. Трансфузиология

1. Цоликлоны анти-а и анти-в применяются для определения

- пробы на индивидуальную совместимость по системе резус
 - группы крови по системе резус
 - группы крови по системе АВ0
 - пробы на индивидуальную совместимость по системе АВ0
-

2. Для контроля лечебного эффекта антикоагулянтов непрямого действия следует в динамике проверять

- протромбиновое время
 - концентрацию фибриногена
 - активированное частичное тромбопластиновое время
 - тромбиновое время
-

3. Введение гепарина натрия показано при лечении кровотечения на почве

- ДВС-синдрома II стадии
 - гемодилюционной коагулопатии
 - ДВС-синдрома IV стадии
 - ДВС-синдрома III стадии
-

4. При кровотечении на почве передозировки гепарином натрия эффективным для гемостаза является применение

- фактора свертывания крови VIII
 - плазмы свежемороженой
 - менадиона натрия бисульфита
 - протамина сульфата
-

5. При гипергепаринемии из расчета на 1 мг циркулирующего гепарина натрия оптимальная доза протамина сульфата составляет (в мг)

- 1
 - 1,5
 - 2
 - 0,5
-

6. Тромбоцитопении относятся к

- нарушениям вторичного гемостаза
 - тромбофилиям
 - нарушениям первичного гемостаза
 - тромбастениям
-

7. Гемофилия а является наследственным заболеванием, связанным с дефектом синтеза и дефицитом фактора

- IX
 - VIII
 - V
 - X
-

8. Гемофилия в является наследственным заболеванием, связанным с дефектом синтеза и дефицитом фактора

- VIII
 - X
 - IX
 - V
-

9. При ангиогемофилии чаще всего имеется дефицит фактора

- IX
 - X
 - Виллебранда
 - VIII
-

10. Уровень глюкозы в крови равен (в ммоль/л)

- 4,3-6,5
 - 2,3-3,5
 - 3,3-5,5
 - 5,3-7,5
-