

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3669. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.05. Клиническая лабораторная диагностика

1. Для постановки реакции непрямой гемагглютинации используют

- комплемент
 - эритроцитарный диагностикум
 - бактериальный диагностикум
 - анатоксин
-

2. Частью биологического материала, используемого для определения содержащихся в нём компонентов, является

- проба
 - контрольная сыворотка
 - анализ
 - образец
-

3. Наиболее высокой избирательностью характеризуется хроматография

- ионообменная
 - аффинная
 - гель-фильтрационная
 - адсорбционная
-

4. Метод турбидиметрии обычно используется для определения

- липидов
 - индивидуальных белков
 - углеводов
 - небелковых азотистых соединений
-

5. В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует

- комплемент
 - альбумин
 - калликреин
 - фибриноген
-

6. Отсутствие уробилина в моче указывает на

- обтурационную желтуху
- гемолитическую желтуху
- паренхиматозную желтуху в период продрома
- болезнь Жильбера

7. К группе собственных (секреторных) ферментов плазмы крови относится

- креатинкиназа
 - протромбин
 - амилаза
 - лактатдегидрогеназа
-

8. При повышенной секреции соматотропина развивается

- акромегалия
 - Базедова болезнь
 - синдром Иценко–Кушинга
 - нанизм
-

9. Контринсулярным гормоном является

- ренин
 - кальцитонин
 - ангиотензин
 - кортизол
-

10. Собирать мочу на стерильность необходимо

- методом пункции мочевого пузыря
 - из общего анализа мочи
 - методом катетеризации мочевого пузыря
 - из средней порции в стерильную посуду
-