

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2059. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.08. Радиология

1. Правильным путём введения радиофармпрепарата при маммосцинтиграфии является

- подкожный
 - **внутривенный**
 - внутримышечный
 - внутриартериальный
-

2. При определении топографии истинно сигнального лимфатического узла при накоплении радиофармпрепарата в лимфатических узлах ii, iii порядков при раке молочной железы применяют

- магнитно-резонансную томографию
 - позитронно-эмиссионную томографию
 - спиральную компьютерную томографию
 - **лимфосцинтиграфию**
-

3. Преимуществом крупных коллоидов при биопсии сигнального лимфатического узла при раке молочной железы является

- более информативный счёт счётчика интраоперационно
 - быстрая доставка коллоида к сигнальному лимфатическому узлу
 - проникновение в истинно сигнальный лимфатический узел
 - **хорошая визуализация сигнального лимфатического узла**
-

4. Минимальным объёмом поражения миокарда, который может быть определён с помощью радионуклидной сцинтиграфии миокарда и дефекта перфузии, является

- объём поражения миокарда более 1 г
 - локальное поражение, составляющее 20% толщины стенки левого желудочка
 - трансмуральное поражение миокарда
 - **объём поражения миокарда более 10 г**
-

5. Радиойодтерапия показана при

- гипотиреозе
 - **рецидиве тиреотоксикоза**
 - компрессии органов шеи
 - тиреоидите
-

6. К отдаленным нежелательным явлениям радиойодаблации/радиойодтерапии относят

- отек в области шеи
 - ксеростомия, особенно при повторных курсах РИТ
 - снижение массы тела
 - тошноту
-

7. К отдаленным последствиям радиойодтерапии относят

- тошноту, рвоту
 - боль в области эпигастрия
 - сиалоденит
 - повышенный риск развития вторых опухолей после многократных курсов РИТ
-

8. При выписке из стационара после проведения радиойодтерапии/ радиойодаблации рекомендуют

- санаторно-курортное лечение
 - принимать душ несколько раз в день
 - ограничить тесное общение с детьми
 - пользоваться только общественным транспортом
-

9. Для ускорения процесса выведения радиофармпрепарата после проведения радиойодаблации/радиойодтерапии рекомендуют

- обильное питье (за исключением пациентов с заболеваниями почек)
 - употребление в пищу йодсодержащих продуктов
 - прием антацидов и адсорбентов
 - употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка
-

10. Радионуклидом для позитронно-эмиссионной томографии является

- йод-131
 - йод-125
 - йод-124
 - йод-123
-