

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3208. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.10. Судебно-медицинская экспертиза

1. Смерть в результате асфиксии обычно наступает в течение (в минутах)

- 14-18
 - **4-8**
 - 1-2
 - 10-12
-

2. К странгуляционной относят асфиксию от

- **удавления петлей**
 - сдавления груди и живота
 - закрытия просвета дыхательных путей
 - закрытия отверстий рта и носа
-

3. К аспирационной относят асфиксию от закрытия

- **просвета дыхательных путей жидкостями**
 - отверстий дыхательных путей сыпучим веществом
 - просвета дыхательных путей предметом
 - отверстий дыхательных путей предметом
-

4. В судебно-медицинской практике наиболее часто встречается механическая асфиксия от

- сдавления груди и живота
 - **повешения**
 - утопления
 - удавления петлей
-

5. При вскрытии трупов людей, погибших в замкнутом пространстве, выявляются признаки

- **общеасфиктические**
 - странгуляции
 - обтурации
 - компрессии
-

6. При смерти от асфиксии наблюдается

- гиперемия кожных покровов
 - **непроизвольная дефекация**
 - серый оттенок трупных пятен
 - густое состояние крови в сосудах
-

7. На танатогенез при повешении преимущественно влияет

- концентрация алкоголя в крови
 - возраст пострадавшего
 - количество оборотов петли
 - положение петли на шее
-

8. При типичном положении петли узел располагается на шее

- сзади
 - спереди
 - сбоку слева
 - сбоку справа
-

9. О прижизненном сдавлении шеи петлёй свидетельствуют

- кровоизлияния в области дна борозды
 - участки уплощения и истончения эпидермиса
 - множественные переломы хрящей гортани
 - множественные переломы подъязычной кости
-

10. Степень выраженности странгуляционной борозды преимущественно зависит от

- пола погибшего
 - материала петли
 - конструкции петли
 - возраста погибшего
-