

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1996. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.11. Ультразвуковая диагностика

1. К эхокардиографическим признакам эксудативного перикардита относят

- расхождение листков перикарда в систолу и диастолу
 - отложение кальция в листках перикарда
 - наличие зоны акинезии в миокарде
 - наличие спаечного процесса в перикарде
-

2. Интенсивность кровоснабжения органа оценивают по величине

- давления крови
 - времени полного кругооборота крови
 - скорости распространения пульсовой волны
 - объёмной скорости кровотока
-

3. Признаком тяжёлого вазоспазма по результатам ткдг является линейная скорость кровотока по средней мозговой артерии (см/сек)

- 180-200
 - >200
 - <120
 - 150-180
-

4. При оценке гемодинамики в периферических сосудах угол инсонации должен быть менее (в градусах)

- 45
 - 30
 - 90
 - 60
-

5. О наличии «гиперэхогенного кишечника» правомочно делать заключение со срока беременности (в неделях)

- 14
 - 24
 - 20
 - 16
-

6. Ультразвуком является звук, частота которого не ниже

- 20000 Гц
 - 1 МГц
 - 15 кГц
 - 30 Гц
-

7. Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях составляет (в м/с)

- 1450
 - 1540
 - 1300
 - 1620
-

8. Скорость распространения ультразвука определяется

- амплитудой
 - средой
 - периодом
 - частотой
-

9. Ультразвук представляет собой

- поперечную механическую волну
 - поток заряженных частиц
 - продольную механическую волну
 - электромагнитную волну
-

10. Свойства среды, через которую проходит ультразвук, определяет

- интенсивность
 - амплитуда
 - сопротивление
 - частота
-