

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1790. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.44. Профпатология

1. После интенсивной физической нагрузки на руки тремор рук

- не изменяется
 - меняется периодически
 - повышается
 - снижается
-

2. Причиной экспираторной одышки является

- легочная рестрикция
 - пневмония
 - бронхиальная обструкция
 - трахеобронхит
-

3. Организация разных профилей медицинской помощи регламентируется

- программой обязательного медицинского страхования
 - порядками оказания медицинской помощи
 - программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
 - лицензией
-

4. Для дифференциальной диагностики аксонопатий и миелінопатий наиболее информативным исследованием является

- иммунологическое исследование ликвора
 - электронейромиография
 - биопсия мышц
 - иммунологическое исследование крови
-

5. При хронических профессиональных молибденозах кроме повышения содержания молибдена всегда повышается содержание

- щелочной фосфатазы
 - креатинфосфокиназы
 - мочевой кислоты
 - АЛТ и АСТ
-

6. При интоксикации свинцом в мазке крови наблюдается

- шизоциты
 - базофильная пунктация эритроцитов
 - акантоциты
 - стоматоциты
-

7. Наиболее частым внепочечным проявлением хронической интоксикации свинцом является

- лихорадка
 - гипохромная анемия
 - артериальная гипотензия
 - диарея
-

8. Показанием для проведения диагностики заболевания профессиональной бронхиальной астмой считают

- факт контакта с производственным аллергеном
 - высокие концентрации пылегазового аэрозоля
 - длительный стаж работы на вредном производстве
 - повышенную распространенность бронхиальной астмы среди работников
-

9. Ранним функциональным признаком профессиональной бронхиальной астмы является

- увеличение объема форсированного выдоха за первую секунду
 - уменьшение жизненной емкости легких
 - уменьшение пиковой скорости выдоха во время работы
 - уменьшение индекса Тиффно
-

10. К аускультативным признакам бронхиальной астмы относят

- амфорическое дыхание
 - свистящие хрипы на выдохе
 - бронхиальное дыхание
 - влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы
-