

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1871. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.62. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

1. Наиболее тяжёлое течение стенокардии наблюдается у пациентов со стенозом

- задней межжелудочковой артерии более 80%
 - среднего сегмента правой коронарной артерии до 60%
 - проксимальным поражением огибающей артерии более 70%
 - ствола левой коронарной артерии более 70%
-

2. При селективной коронароангиографии введение контрастного вещества производится в

- устье правой и левой коронарных артерий отдельно
 - устье аорты и основной ствол левой коронарной артерии
 - кубитальную, паховую или подключичную вену
 - огибающую артерию и ветви правой коронарной артерии
-

3. Наиболее информативным методом при выявлении выпота в перикард является

- электрокардиография с дополнительными отведениями
 - перкуссия с определением границ сердца
 - рентгенография органов грудной клетки
 - эхокардиография
-

4. Пороговое значение поглощённой дозы, достаточное для возникновения временной эритемы, составляет (в греях)

- 5
 - 2
 - 7
 - 10
-

5. Пороговое значение поглощённой дозы, достаточное для возникновения постоянной эпилепсии, составляет (в греях)

- 7
 - 5
 - 2
 - 10
-

6. В норме число артерий, отходящих от дуги аорты, равно

- 4
 - 1
 - 2
 - 3
-

7. В норме отдельным стволом от аорты отходит _____ артерия

- правая общая сонная
 - правая подключичная
 - левая общая сонная
 - левая позвоночная
-

8. В норме количество синусов аорты равно

- пяти
 - трьём
 - двум
 - четырём
-

9. В норме коронарных артерий

- две
 - три
 - четыре
 - пять
-

10. Большую часть миокарда кровоснабжает _____ артерия

- правая коронарная
 - передняя межжелудочковая
 - задняя межжелудочковая
 - левая коронарная
-