

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2945. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.65. Торакальная хирургия

1. К методам верификации туберкулёза относят

- пробное лечение и динамическое наблюдение
 - рентгенологический и радиоизотопный
 - биохимический и иммунологический
 - **бактериологический и цито-гистологический**
-

2. После постановки внутрикожной пробы с препаратом аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (диаскинтест) результат оценивают через (в часах)

- 24
 - 12
 - **72**
 - 6
-

3. Парадоксальное дыхание наиболее часто наблюдается при

- пневмонии
 - эмфиземе лёгких
 - **пневмотораксе**
 - ларингоспазме
-

4. При пункции грудной клетки следует учитывать, что межрёберные артерия и нерв располагаются по краю ребра

- переднему
 - заднему
 - **нижнему**
 - верхнему
-

5. Пункцию плевральной полости при пневмотораксе необходимо выполнять _____ межреберье

- **во 2**
 - в 1
 - в 4
 - в 7
-

6. К главным мероприятиям в лечении спонтанного пневмоторакса относят

- наблюдение и лечение основного заболевания
 - кардиотропную терапию и аналептики
 - наложение пневмоперитонеума и наблюдение
 - плевральную пункцию, активный дренаж и аспирацию
-

7. Субпекторальное клетчаточное пространство расположено между

- листками поверхностной и собственной грудной фасции
 - передним листком ключично-грудной фасции и малой грудной мышцей
 - малой грудной мышцей и задним листком собственной грудной фасции
 - глубокой пластинкой грудной фасции и ключично-грудной фасцией
-

8. В первую очередь с целью уточнения диагноза у больных с подозрением на острый абсцесс лёгкого следует выполнить

- рентгенографию органов грудной полости
 - ангиопульмонографию
 - бронхоскопию
 - компьютерную томографию органов грудной полости
-

9. Больному со сформированным фибротораксом после травмы грудной клетки, осложнённой гемотораксом показана

- консервативная противовоспалительная терапия
 - торакоцентез с активной аспирацией
 - пункция плевральной полости
 - торакотомия с декортикацией лёгкого
-

10. Малый гемоторакс характеризуется наличием крови в плевральной полости до уровня _____ ребра

- VII-VIII
 - II-III
 - V-VI
 - VIII-IX
-