

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3576. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

99.08.39. Стоматология (ординатура, ПП)

1. ПРИ ОКАЗАНИИ ГРАЖДАНИНУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ (ФОРМИРУЕТСЯ)

- по желанию пациента
 - при окончании лечения
 - с первого дня заболевания или травмы
 - в день признания его временно нетрудоспособным
-

2. КОРЕНЬ В СТАДИИ НЕЗАКРЫТОЙ ВЕРХУШКИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОЕЦИРУЕТСЯ

- нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие узкое
 - нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие широкое
 - короче нормальной длины, корневой канал узкий
 - нормальной длины, апикальное отверстие узкое, периодонтальная щель у верхушки корня широкая
-

3. КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

- меловидно-крапчатая
 - бороздчатая
 - «рифлёная» эмаль
 - дисплазия Капдепона
-

4. ЗАТРУДНЁННОЕ, УЧАЩЁННОЕ ДЫХАНИЕ С ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ У РЕБЁНКА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- обморока
 - сердечно-сосудистого коллапса
 - болевого шока
 - анафилактического шока
-

5. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ВИДОМ ТРАВМЫ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- перелом корня
 - вывих зуба
 - ушиб зуба
 - отлом коронки
-

6. ТРАВМА ЗАЧАТКА ПОСТОЯННОГО ЗУБА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННОГО ЗУБА В ВИДЕ

- неполного вывиха
 - ушиба зуба
 - внедрённого (вколоченного) вывиха
 - перелома корня
-

7. ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРОМ ВЫВИХА РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- мезиальная окклюзия
 - глубокий прогнатический прикус
 - мелкое преддверие рта
 - множественный кариес этих зубов и его осложнения
-

8. МЕТОД ВИТАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ВЫЯВЛЯЕТ ОЧАГОВУЮ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ ПРИ

- белом кариозном пятне
 - эрозии эмали
 - пятнистой форме гипоплазии
 - кариозном пигментированном пятне
-

9. ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ МЕЖЗУБНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА РЕНТГЕНОГРАММАХ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ

- атрофическом гингивите
 - локальном пародонтите
 - генерализованном гингивите
 - локальном и генерализованном гингивите
-

10. ФОРМАЛИНОВАЯ ПРОБА ПОЛОЖИТЕЛЬНА ПРИ

- атрофическом гингивите
 - пародонтите
 - катаральном гингивите
 - гипертрофическом гингивите
-