

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2474. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **31.08.38. Косметология**

**1. К нервным волокнам, иннервирующим мышцу, поднимающую волос, относят**

- адренергические симпатические
  - парасимпатические
  - сенсорные
  - холинергические симпатические
- 

**2. Филаггрин синтезируется в \_\_\_\_\_ слое**

- базальном
  - шиповатом
  - зернистом
  - блестящем
- 

**3. Отличительной особенностью зернистых клеток является содержание в их цитоплазме**

- фаголизосом
  - гранул Бирбека
  - тонофиламентов
  - гранул Одланда
- 

**4. Инкапсулированных нейрорецепторов больше всего**

- на разгибательной поверхности конечностей
  - в подвздошной области
  - на спине
  - на кончиках пальцев
- 

**5. Водно-липидная мантия кожи является фактором**

- защиты
  - терморегуляции
  - увлажнения
  - иммунной реактивности
- 

**6. Отсутствие пигмента у альбиносов связано с отсутствием**

- меланоцитов
  - тирозиназы
  - клеток Лангерганса
  - меланосом
-

## 7. Апоптоз в отличие от некроза клеток развивается в результате

- повреждения клеточной мембраны физическими факторами
  - повреждения клеточной мембраны химическими агентами
  - генетического программирования
  - воспалительного процесса
- 

## 8. С помощью апоптоза осуществляется регуляция

- количества клеток в коже
  - иммунного ответа в коже
  - фагоцитоза
  - воспалительного процесса
- 

## 9. Примером апоптоза у здорового человека является

- атрофия
  - шелушение кожи при солнечном загаре
  - купероз
  - дисхромия
- 

## 10. Воздействие цитокинов на клетку опосредовано

- рецепторами на ядрах клеток
  - пептидами
  - цитоплазматическими белками
  - рецепторами на внешней стороне мембраны клеток
-