

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 4202. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.42. Неврология

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- **в день признания его временно нетрудоспособным**
 - по желанию пациента
 - с первого дня заболевания или травмы
 - при окончании лечения
-

2. При поражении задних рогов спинного мозга возникает

- **сегментарно-диссоциированный тип расстройства чувствительности**
 - расстройство глубокой чувствительности по проводниковому типу
 - периферический парез
 - расстройство болевой чувствительности по проводниковому типу
-

3. Арефлексия детрузора мочевого пузыря возникает при поражении

- **крестцового отдела спинного мозга**
 - ствола головного мозга
 - шейного отдела спинного мозга
 - поясничного отдела спинного мозга
-

4. Для лечения невралгии тройничного нерва используют

- Пирацетам
 - витамины группы В
 - **Карбамазепин**
 - Церебролизин
-

5. Псевдобульбарный синдром возникает при поражении

- добавочного нерва
 - подъязычного нерва
 - **корково-ядерного пути с двух сторон**
 - языкоглоточного и блуждающего нервов
-

6. В патофизиологии болезни Альцгеймера наиболее важную роль играет недостаточность

- норадренергическая
- серотонинергическая
- дофаминергическая
- **ацетилхолинергическая**

7. Основным методом диагностики полиневропатии является

- электронейромиография
 - биохимический анализ цереброспинальной жидкости
 - МРТ периферических нервов
 - ультразвуковое исследование нервов
-

8. Основной целью проведения рентгенографии позвоночника при боли в спине является

- выявление межпозвонковых грыж
 - определение выраженности остеохондроза позвоночника
 - определение степени остеопороза
 - определение локализации сдавления корешковых структур
-

9. Лечение невриномы мостомозжечкового угла проводится

- лучевой терапией
 - хирургическим удалением опухоли
 - химиотерапией
 - комбинацией химиотерапии и лучевой терапии
-

10. Признаком посткоммоционного синдрома является

- атаксия
 - астения
 - гемиплегия
 - диплопия
-