

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 993. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.78. Физическая и реабилитационная медицина

1. Пациентам с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий показана длительная терапия

- низкомолекулярными гепаринами
 - препаратами ацетилсалициловой кислоты
 - ингибиторами P2Y₁₂ рецепторов тромбоцитов
 - оральными антикоагулянтами
-

2. При шейной радикулопатии боль обычно усиливается при наклоне головы

- в противоположную сторону
 - в больную сторону
 - вперед
 - назад
-

3. Упражнения, выполняемые мысленно, называются

- изометрическими
 - идеомоторными
 - рефлекторными
 - пассивными
-

4. Время процедуры при электрофорезе области шейных симпатических узлов составляет до _____ минут

- 40
 - 50
 - 60
 - 20
-

5. Сила тока при гальванизации области шейных симпатических узлов составляет (в миллиамперах)

- 15-20
 - 4-10
 - 2-4
 - 30-40
-

6. Скипидарные ванны из «белой эмульсии» показаны при

- хроническом простатите
 - хронической почечной недостаточности
 - ишемической болезни 3 функционального класса
 - мерцательной аритмии
-

7. Лечебный эффект квч-терапии в наркологии достигается за счет

- анаболического эффекта
 - активизации системы опиоидных рецепторов
 - противозудного действия
 - сильного болеутоляющего действия
-

8. Лечебное действие квч-терапии при псориазе осуществляется благодаря _____ эффекту

- противоотечному
 - регенеративному
 - противовоспалительному
 - секреторному
-

9. При квч-терапии области желудка длина электромагнитной волны составляет (в миллиметрах)

- 5,6 или 7,1
 - 2,4 или 2,7
 - 1,5 или 8,5
 - 3,7 или 9,8
-

10. Плотность потока мощности при квч-воздействии составляет (в милливаттах на сантиметр квадратный)

- 10
 - 20
 - 30
 - 40
-