

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3045. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.05.03. Стоматология

1. При системной гипоплазии эмали поражаются

- зубы одного периода формирования
 - временные и постоянные резцы
 - зубы-антагонисты
 - только первые моляры
-

2. Уменьшение клинической высоты коронки зуба характерно для

- полного вывиха
 - вывиха зуба без смещения
 - вколоченного вывиха
 - ушиба зуба
-

3. Вторичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите является

- пузырьёк
 - пятно
 - эрозия
 - папула
-

4. Начальный кариес (стадия мелового пятна) временных зубов характеризуется

- поверхностной деминерализацией
 - некрозом эмали
 - нарушением формирования эмали
 - подповерхностной деминерализацией
-

5. Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с

- репаративной гранулёмой
 - цементомой
 - одонтомой
 - радикулярной кистой
-

6. Отвёрткообразная или бочкообразная форма коронки и полулунная выемка на режущем крае центральных резцов характерны для зубов

- Тернера
- Пфлюгера
- Гетчинсона
- Фурнье

7. Возбудителем герпангины является

- вирус простого герпеса
 - цитомегаловирус
 - **вирус Коксаки**
 - вирус гриппа
-

8. При хронических формах пульпита обнаруживается микрофлора

- грибковая
 - стафилококковая
 - стрептококковая
 - **смешанная**
-

9. Идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта является синдромом

- **Папийона – Лефевра**
 - Стентона – Капдепона
 - Аспергера
 - Блоха – Сульцбергера
-

10. Закладка зубной пластинки происходит в период внутриутробного развития плода на неделе

- 8-9
 - 21-30
 - **6-7**
 - 10-16
-